Integralrechnung

Arno Fehringer

Juni 2022

Axiom der Intervallschachtelung

Eine Folge ineinandergeschachtelter Intervalle $[a_n; b_n]_{n \in \mathbb{N}}$, deren Intervalllängen gegen 0 streben, bestimmen genau eine Zahl z , **Zentrum** genannt, die innerhalb aller Intervalle liegt :

(1) Intervallschachtelung : $a_n \leq a_{n+1} < b_{n+1} \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$

(2) Intervalllängen : $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$

(3) Zentrum : $z \in [a_n; b_n]$ für alle $n \in \mathbb{N}$

Eine Intervallschachtelung kennt man durch die näherungsweise Bestimmung von $\sqrt{2}$ als Länge der Diagonalen im Einheitsquadrat .

$$d^2 = 1^2 + 1^2$$

$$d^2 = 2 \quad \Rightarrow \quad d = \sqrt{2}$$

Näherungen für d :

$a_1 = 1 < d < 2 = b_1$	$b_1 - a_1 = 1$
$a_2 = 1,4 < d < 1,5 = b_2$	$b_2 - a_2 = 0,1$
$a_3 = 1,41 < d < 1,42 = b_3$	$b_3 - a_3 = 0,01$
$a_4 = 1,414 < d < 1,415 = b_4$	$b_4 - a_4 = 0,001$

Bereits griechische Mathematiker haben vor über 2000 Jahren gezeigt, dass dieser Prozess der Einschachtelung von d niemals aufhört, dass d also durch keine Dezimalzahl darstellbar ist, sondern eben eine Zahl, die durch die Intervallschachtelung festgelegt sein muss .

Figurierte Zahlen und Summenregeln

$$2 \sum_{i=1}^n i = n(n+1)$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Figurierte Zahlen und Summenregeln

$$3 \sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n i = n(n+1)(n+1)$$

$$3 \sum_{i=1}^n i^2 + \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)(n+1)$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 + \frac{n(n+1)}{6} = \frac{2n(n+1)(n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{2n(n+1)(n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{2n(n+1)(n+1) - n(n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2(n+1) - 1)}{6}$$

Figurierte Zahlen und Summenregeln

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\sum_{i=1}^n i \right)^2$$

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

Ergebnis :

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2(n+1) - 1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

Man kann selbstverständlich auch Formeln für die Summe von Potenzen mit beliebigen Exponenten $\sum_{i=1}^n i^k$, $k \in \mathbb{N}$ entwickeln .

Integration als Näherungsverfahren zur Berechnung von krummlinig begrenzten Flächen

Gegeben sei der Graph der Funktion $y = f(x) = x^2$.
Gesucht ist der Flächeninhalt $A(x)$!

Integration als Näherungsverfahren zur Berechnung von krummlinig begrenzten Flächen

Näherungen von oben

$$\bar{A}_1 = f(x) x$$

$$\bar{A}_2 = \sum_{i=1}^2 f(x_i) \Delta x, \quad x_i = \frac{i}{2} x, \quad \Delta x = \frac{x}{2}$$

$$\bar{A}_4 = \sum_{i=1}^4 f(x_i) \Delta x, \quad x_i = \frac{i}{4} x, \quad \Delta x = \frac{x}{4}$$

$$\bar{A}_8 = \sum_{i=1}^8 f(x_i) \Delta x, \quad x_i = \frac{i}{8} x, \quad \Delta x = \frac{x}{8}$$

$$A(x) < \bar{A}_8 < \bar{A}_4 < \bar{A}_2 < \bar{A}_1$$

Integration als Näherungsverfahren zur Berechnung von krummlinig begrenzten Flächen

2^n -te Näherung von oben

$$\bar{A}_{2^n} = \sum_{i=1}^{2^n} f(x_i) \Delta x, \quad x_i = \frac{i}{2^n} x, \quad \Delta x = \frac{x}{2^n}$$

2^n -te Näherung von unten

$$\underline{A}_{2^n} = \sum_{i=0}^{2^n-1} f(x_i) \Delta x, \quad x_i = \frac{i-1}{2^n} x, \quad \Delta x = \frac{x}{2^n}$$

$$\underline{A}_1 < \dots < \underline{A}_{2^n} < A(x) < \bar{A}_{2^n} < \dots < \bar{A}_1$$

Integration als Näherungsverfahren zur Berechnung von krummlinig begrenzten Flächen

$$\bar{A}_{2^n} - \underline{A}_{2^n} = f(x) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{x}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\bar{A}_{2^n} - \underline{A}_{2^n}) = 0$$

Damit existiert der gesuchte
Flächeninhalt $A(x)$ als Zentrum der
Intervallschachtelung $[\underline{A}_{2^n}; \bar{A}_{2^n}]_{n \in \mathbb{N}}$

Berechnung von $A(x)$

Die Berechnung von $A(x)$ ergibt sich nun aus den Grenzwerten $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{A}_{2^n}$

oder $\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{A}_{2^n}$:

$$\begin{aligned} A(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{A}_{2^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2^n} f(x_i) \Delta x \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2^n} \left(\frac{i}{2^n} x \right)^2 \frac{x}{2^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2^n} i^2 \frac{x^3}{(2^n)^3} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^3}{(2^n)^3} \sum_{i=1}^{2^n} i^2 \end{aligned}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^3}{(2^n)^3} \sum_{i=1}^{2^n} i^2$$

Bevor man jetzt weiter rechnet, sollte man die Summenformel $\sum_{i=1}^n i^2$ von S. 5 etwas vereinfachen :

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2(n+1) - 1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n-1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{(n^2+n)(2n-1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{2n^3+n^2-n}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{2n^3+n^2-n}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{6} - \frac{n}{6}$$

$$\sum_{i=1}^{2^n} i^2 = \frac{(2^n)^3}{3} + \frac{(2^n)^2}{6} - \frac{(2^n)}{6}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^3}{(2^n)^3} \sum_{i=1}^{2^n} i^2 \\
&\quad \sum_{i=1}^{2^n} i^2 = \frac{(2^n)^3}{3} + \frac{(2^n)^2}{6} - \frac{(2^n)}{6} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^3}{(2^n)^3} \left(\frac{(2^n)^3}{3} + \frac{(2^n)^2}{6} - \frac{(2^n)}{6} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^3}{3} + \frac{x^3}{6(2^n)} - \frac{x^3}{(2^n)^2} = \frac{x^3}{3}
\end{aligned}$$

$$A(x) = \frac{1}{3} x^3$$

Der Flächeninhalt unter der Kurve $y = x^2$ über dem Intervall $[0; x]$ ist gleich $\frac{1}{3} x^3$.

Auf entsprechende Art kann man die Flächeninhalt unter den Kurven

$y = x^1$, $y = x^3$, $y = x^4$, ... über dem Intervall $[0; x]$ berechnen .

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt :

$f(x)$	$A(x)$
x^1	$\frac{1}{2}x^2$
x^2	$\frac{1}{3}x^3$
x^3	$\frac{1}{4}x^4$
x^n	?

Schreibweise der Flächeninhaltsfunktion nach Leibniz :

Die Berechnung der Fläche $A(x)$ unter der Kurve über dem Intervall $[0;x]$ ergibt sich aus der Summation der Flächeninhalte $f(x_i)\Delta x$, $i = 1, \dots, 2^n$ durch anschließende Grenzwertbildung $n \rightarrow \infty$:

$$A(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2^n} f(x_i) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{x}{2^n}$$

$$A(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^{2^n} f(x_i) \Delta x$$

$$A(x) = \int_0^x f(\xi) d\xi$$

Schreibweise nach Leibniz (1646 - 1716)
„Integral 0 bis x $f(\xi) d\xi$ “

Hier steht der Term $f(\xi)$ für $f(x_i)$ und $d\xi$ für die „unendlich kleine Größe“

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} x .$$

Das Zeichen $\int$ stellt ein lang gezogenes S dar und erinnert an die Summation .

Wenn man die Tabelle betrachtet, könnte man auf die Idee kommen, dass wenn $f(x) = x^n$, der Flächeninhalt $A(x) = \frac{1}{n+1}x^{n+1}$ ist.

$f(x)$	$A(x)$
x^1	$\frac{1}{2}x^2$
x^2	$\frac{1}{3}x^3$
x^3	$\frac{1}{4}x^4$
x^n	?

Oder schärfer formuliert , die Ableitung der Flächeninhaltsfunktion

$A(x) = \frac{1}{n+1}x^{n+1}$ zur Funktion $f(x) = x^n$ ist gleich der Funktion $f(x)$:

$f(x)$	$A(x)$
x^1	$\frac{1}{2}x^2$
x^2	$\frac{1}{3}x^3$
x^3	$\frac{1}{4}x^4$
x^n	?

$$f(x) = x^n \quad \Rightarrow \quad A'(x) = x^n$$

Möglicherweise gilt die entsprechende Aussage für jede integrierbare Funktion $f(x)$. Dieser Idee kann man nun theoretisch nachgehen !

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Behauptung :

Für die Flächeninhaltsfunktion $A(x) = \int_0^x f(\xi) d\xi$ zu der integrierbaren Funktion $f(x)$ gilt : $A'(x) = f(x)$

Beweis :

$$\text{Zu zeigen : } A'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow \infty} \frac{A(x+\Delta x) - A(x)}{\Delta x} = f(x)$$

Zu zeigen : $A'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow \infty} \frac{A(x+\Delta x) - A(x)}{\Delta x} = f(x)$

Flächenbetrachtung :

$$f_{\min[x; x+\Delta x]} \Delta x \leq A(x+\Delta x) - A(x) \leq f_{\max[x; x+\Delta x]} \Delta x$$

$$f_{\min[x; x+\Delta x]} \leq \frac{A(x+\Delta x) - A(x)}{\Delta x} \leq f_{\max[x; x+\Delta x]}$$

Wegen $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f_{\min[x; x+\Delta x]} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f_{\max[x; x+\Delta x]} = f(x)$ folgt

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{A(x+\Delta x) - A(x)}{\Delta x} = f(x) .$$

q.e.d

Bemerkungen :

Die Funktion $A(x) = \int_0^x f(\xi) d\xi$ heißt **Stammfunktion** von $f(x)$, da

$A'(x) = f(x)$. Mit $A(x) = \int_0^x f(\xi) d\xi$ ist auch jede Funktion $A(x)+C$, C konstant, eine Stammfunktion von $f(x)$.

Der **Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung** gestattet nun zwei weitere Aussagen zur Berechnung des Flächeninhalts unter der Kurve $y = f(x)$ über dem Intervall $[a;b]$:

$$\int_a^b f(\xi) \, d\xi := \int_0^b f(\xi) \, d\xi - \int_0^a f(\xi) \, d\xi$$

(1) $\int_a^b f(\xi) \, d\xi := A(b) - A(a)$ **Schreibweise :** $\int_a^b f(\xi) \, d\xi = [A(\xi)]_a^b$

(2) Ist $A(x)+C$ irgend eine Stammfunktion von $f(x)$, so kann man auch mit dieser Funktion den Flächeninhalt ausrechnen :

$$\int_a^b f(\xi) \, d\xi = A(b) - A(a)$$

$$\int_a^b f(\xi) \, d\xi = A(b)+C - (A(a)+C)$$

$$\int_a^b f(\xi) \, d\xi = [A(\xi)+C]_a^b$$